

**ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ «ԴԱՍՏԱԿԵՐՏԻ ՊՂԻՆՁ-ՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ
(ՆԱԽԿԻՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝ «ԷՆ ԷՌ ԷՄ (ՆԵՅՉՐԼ ՌԻՍՈՐՍ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ)» ՓԲԸ)
ԴԱՍՏԱԿԵՐՏԻ ՊՂԻՆՁ-ՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ
ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ**

Կենդանական աշխարհ

Բարգուշատի լեռնաշղթայի հյուսիսային մակրոլանջերին, մոտավորապես 1890-2730 մ բացարձակ բարձրությունների վրա (նկար1) Դաստակերտի հանքի համար հայցվող տարածքում զոնալ բուսականության տիպերից առկա են մարգագետնատափաստանները, դաշտավլուկազգի և տարախոտադաշտավլուկազգի ենթալայան մարգագետինները: Ազոնալ ներկայացված է պետրոֆիլ բուսականությունը ժայռային բացվածքների և քարաթափուկների վրա, ինչպես նաև ջրաճահճային բուսականությանը տարածքում հոսող Այրիգետի վտակ հանդիսացող Կոշկոշտի և Դաստակերտ գետերի ափերին: Ուսումնասիրվող տարածքում անտառներ չկան, դենդրոֆլորան ներկայացված է գիհու, սալորենու, տանձենու, սզնու, մասրենու բուսատներով:



Նկար. 1

Վերը նկարագրված ողջ լանդշաֆտային և բուսական տեսակները մեծապես կանխորոշում են Դաստակերտի պոլինձ-մոլիբդենային հանքավայրի համար հայցվող տարածքում բնակվող և հանդիպող ողնաշարավորների տեսակային կազմը:

ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ԱՆՈՂՆԱՇԱՐՆԵՐ

ՆԱԽԱԴԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Նախապատրաստական աշխատանքները ընդգրկել են բոլոր հասանելի գրական տվյալների վերլուծությունը: Վերհանվել են Սյունիքի մարզի, ինչպես նաև Սիսիանի տարածաշրջանի անողնաշար կենդանիների ֆաունայի մասին հրատարակված տվյալները, այդ թվում հազվագյուտ և անհետացող կենդանատեսակների վերաբերյալ:

Առկա տվյալներ (Սյունիքի մարզ)

Համաձայն Միջազգային Ֆինանսական Կորպորացիայի (IFC) նորմատիվների, աշխատանքի առաջին փուլը նախատեսում է առկա նյութերի վերլուծությունը և ուսումնասիրվող խմբերի ընտրությունը:

Հետագա վերլուծության ընթացքում վեր են հանվել տվյալներ մի շարք համեմատաբար լավ ուսումնասիրված բարձրագույն տաքսոնների (կարգաբանական խմբերի) վերաբերյալ: Այս տաքսոնները կազմում են Հայաստանի ֆաունայի մոտ 1/8-ը, ունեն զանազան էկոլոգիական կապեր ուստի, ստացված տվյալները բավական ռեպրեզենտատիվ են (ներկայացուցչական):

Հայաստանի ֆաունայի տարբեր բարձրագույն կարգաբանական խմբերին նվիրված աշխատությունների վերլուծությունը թույլ տվեց Սյունիքի մարզից նշել 1780 տեսակ, որոնք պատկանում են Միջատների դասին և Փափկամարմինների տիպին (Աղյուսակ 1):

Աղյուսակ 1. Սյունիքի մարզի և Սիսիանի տարածաշրջանի անողնաշար կենդանիների ֆաունայի ակնարկ

Տաքսոն	Տեսակների քանակը		Տեղակատվության աղբյուրները
	Սյունիքի մարզ	Սիսիանի տարածաշրջան	
Տիպ թաթկամարմիններ (Mollusca) (միայն ցամաքային)	71	31	Акрамовский, 1967
Տիպ Հատվածոտանիներ (Arthropoda)			
Դաս Միջատներ (Insecta)			
Կարգ Ուղղաթևեր (Orhoptera)			

Վերնաընտանիք Ծղրիդներ (Tettigonoidea)	26	8	Авагян, 1984
Վերնաընտանիք Մորեխներ (Acridoidea)	66	18	Авагян, 1975
Կարգ Հավասարաթևեր (Homoptera)			
Ենթակարգ Որդաններ (Coccoidea)	38	18	Борхсениус, 1949, Тер-Григорян, 1973
*Դենդրոֆիլ հավասարաթևեր	61	21	Мирзоян, 1977
Կարգ Կիսակարծրաթևեր (Hemiptera)			
Դենդրոֆիլ կիսակարծրաթևեր	5	2	Мирзоян, 1977
Կարգ Կարծրաթևեր կամ բզեզներ (Coleoptera)			
Ընտանիք Գնայուկ բզեզներ (Carabidae, pars.)	120	57	Яблоков-Хнзорян, 1976
Վերնաընտանիք Թերթիկաբեղավորներ (Scarabaeoidea)	119	52	Яблоков-Хнзорян, 1967
Ընտանիք Չրխկաններ (Elateridae)	49	10	Марджанян, 1986
Ընտանիք Երկարաբեղիկներ (Cerambycidae)	175	56	Плавильщиков, 1949
Ընտանիք Թարախահաններ (Meloidae)	31	16	Яблоков-Хнзорян, 1983
Ընտանիք Սևամարմիններ (Tenebrionidae)	65	28	Яблоков-Хнзорян, 1983, Nabozhenko et al., 2021
Ընտանիք Ընդակերներ (Bruchidae)	36	6	Карапетын, 1985
Ընտանիք Փղիկներ (Curculionidae)	160	102	Тер-Минасян, 1947
* Դենդրոֆիլ կարծրաթևեր	126	36	Мирзоян, 1977
Կարգ Թեփուկաթևեր կամ թիթեռներ (Lepidoptera)			
Ցերեկային թիթեռներ (Rhopalocera)	126	54	Tuzov (ed.), 1997, 2000
Ընտանիք Երկրաչափ թիթեռներ (Geometridae)	170	65	Վարդիկյան, 1980
Ընտանիք Բվիներ (Noctuidae) (դենդրոֆիլ)	136	71	Мирзоян, 1991
Heterocera ենթակարգի այլ դենդրոֆիլ տեսակներ	59	15	Мирзоян, 1977
Կարգ Երկթևեր (Diptera)			
Ընտանիք Մլակներ (Simuliidae)	28	7	Тертерян, 1968
Դենդրոֆիլ երկթևեր	2	2	Мирзоян, 1977
Կարգ Թաղանթաթևեր (Hymenoptera)			
Ընտանիք Մրջուներ (Formicidae)	65	16	Аракелян, 1994
Ընտանիք Էնցիրտիդներ (Encyrtidae)	9	2	Эртевцян, 1986
* Դենդրոֆիլ թաղանթաթևեր	37	14	Мирзоян, 1977

Ընդամենը	1780	698	
----------	------	-----	--

*Բացառությամբ առանձին հաշվարկած ընտանիքների.

Առկա տվյալներ (Սիսիանի տարածաշրջան)

Սիսիանի տարածաշրջանի ֆաունայի վերաբերյալ տվյալները նույնպես ամփոփված են Աղյուսակ 1-ում: Ընդհանուր առմամբ, տարածաշրջանից նշված է 698 տեսակ:

Հազվադեպ և անհետացող հատուկ պահպանվող տեսակներ

Հայաստանի Կարմիր գրքում գրանցված հազվադեպ և անհետացող 153 անողնաշար կենդանատեսակներից Սյունիքի մարզում ներկայացված են 55-ը (5 փափկամարմին և 50 միջատ): Սրանցից միայն 10 տեսակի միջատներ հանդիպում են Սիսիանի տարածաշրջանում; ցուցակը բերվում ստորև.

ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված անողնաշար կենդանիների ցանկ

Միջատներ - Insecta

Կարգ Ուղղաթևեր (Orthoptera)

1. Մորեխ հայկական - *Gomphocerus armeniacus* (Uvarov, 1931)

Կարգ Կարծրաթևեր կամ բզեզներ (Coleoptera)

2. Կաղնու մեծ երկարաբեղիկ - *Cerambyx cerdo acuminatus* Motschulsky, 1852
3. Երկգիծ երկարաբեղիկ - *Dorcadion bistriatum* Pic, 1898
4. Գորբունովի երկարաբեղիկ - *Dorcadion gorbunovi* Danilevsky, 1985
5. Սևլճյան երկարաբեղիկ - *Dorcadion sevliczi* Danilevsky, 1985

Կարգ Թռչնուկաթևեր կամ թիթեռներ (Lepidoptera)

6. Մենմոզինա կամ սև ապուլոն - *Parnassius mnemosyne rjabovi* Sheljuzhko, 1935
7. Ալեքսանոր առագաստաթիթեռ - *Papilio alexanor orientalis* Romanoff, 1884
8. Իֆիգենիա կապտաթիթեռ - *Agrodiaetus iphigenia araratensis* De Lesse, 1957
9. Պրոզերպինա իլիկաթիթեռ - *Proserpinus proserpina* (Pallas, 1772)
10. Կուլնեցովի երկրաչափ թիթեռ - *Ortholitha kuznetzovi* Wardikian, 1957

Որպես ներկայացուցչական (ռեպրեզենտատիվ) խումբ ընտրվել են բզեզների (Coleoptera) կարգի ներկայացուցիչները: Բացի բզեզների ֆաունայի վերլուծությունից, հատուկ ուշադրություն է հատկացվել ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված բոլոր կարգաբանական խմբերի տեսակների հայտնաբերմանը:

Դաշտային հետազոտություններ

Ներկայացուցչական (ռեպրեզենտատիվ) խմբի՝ բզեզների տեսակային կազմը որոշելու համար կիրառվել են միջատաբանական հետազոտությունների ավանդական մեթոդներ՝ ձեռքի հավաք բուսականությունից, քարերի տակից, հողի մակերեսից, հավաք ցանցի միջոցով (այդ թվում հնձման եղանակով), բույսերից թափտալով և այլն: Քանի որ աշխատանքներն իրականացվել են միջատների մեծամասնության ակտիվության ավարտից հետո, որոնվել են նաև միջատների

մնացարդները, թրթուռները և գործունեության նշանները (թռիչքի անցկեր, թրթուռային անցքուղիներ):

Տարածքի համար ընդհանուր առմամբ նշվել են 18 ընտանիքների պատկանող 61 տեսակի բզեզներ, այդ թվում վերին հատվածում՝ 26 և ստորին հատվածում 39 տեսակ (տես Աղյուսակ 2-ը):

Աշխատանքների ընթացքում ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված անողնաշար կենդանիների որևէ տեսակ չի հայտնաբերվել:

Աղյուսակ 2. Դաստակերտի
պլանավորվող հանքի
բզեզների ֆաունայի կազմը

NN	Նյութի հավաքի վայրերը Բզեզների տեսակները	Վերին հատված	Ստորին հատված	Ծանոթութ յուն*
	1. Ընտանիք Գնայուկ բզեզներ - Carabidae			
1.	Carabus cribratus Quensel, 1806	+		EC
2.	Cicindela desertorum Dejean, 1825		+	EC
3.	Bembidion caucasicus (Motschulsky, 1844)		+	EC
4.	Panagaeus cruxmajor (Linnaeus, 1758	+		
5.	Harpalus rufipes (Degeer, 1774)		+	
6.	Harpalus serripes (Quensel, 1806)	+		
7.	Harpalus rubripes (Duftschmid, 1812) B	+	+	
8.	Harpalus cf. saxicola Dejean, 1829	+		
9.	Badister bipustulatus (Fabricius, 1792)	+		
10.	Calathus ambiguus (Paykull, 1790)	+	+	
11.	Paradromius linearis (Olivier, 1795)		+	
12.	Cymindis scapularis Schaum, 1857	+	+	
13.	Brachinus explodens Duftschmid, 1812		+	
	2. Ընտանիք լողաբզեզներ – Dytiscidae			
14.	Platambus lunulatus (Steven, 1829)		+	
	3. Ընտանիք Լեշակերներ –Silphidae			
15.	Silpha obscura Linnaeus, 1758		+	
	4. Ընտանիք Սրամարմիններ Staphylinidae			
16.	Tachynus cf. laticollis Gravenhorst, 1802		+	
17.	Xantholinus sp.	+		
18.	Staphylinus cf. eurytus	+		
19.	Tasgius gracilicornis (Hochhuth, 1849)	+	+	
20.	Phylonthus cf. succicola Thomson, 1860		+	
21.	Quedius sp.		+	
22.	Ocypus picipennis (Fabricius, 1792)	+	+	

	5. Ընտանիք Histeridae			
23.	Saprinus sp.		+	
24.	Hister quadrimaculatus Linnaeus, 1758	+	+	
	Ընտանիք Ջրասերներ - Hydrophylidae			
25.	Sphaeridium scarabaeoides (Linnaeus, 1758)			
	6. Ընտանիք Թերթիկաբեղավորներ - Scarabaeidae			
26.	Onthophagus fracticornis (Preyssl, 1790)		+	
27.	Euonicicellus fulvus Goeze, 1777			
28.	Aphodius fimetarius (Linnaeus, 1758)		+	
29.	Chilothorax distinctus (Müller 1776)		+	
30.	Blitopertha nigripennis (Reitter, 1888)	+		
31.	Oxythyrea cinctella (Schaum, 1841)		+	
	7. Ընտանիք Ոսկերգեղներ - Buprestidae			
32.	Capnodis tenebricosa (Olivier, 1790)	+		
33.	Sphenoptera fallatrix Obenberger, 1927	+		ET
34.	Meliboeus robustus (Kuester, 1852)		+	
	8. Ընտանիք Փափկամարմին բզեզներ - Cantharidae			
35.	Cantharis cf. melaspis (Chevrolat, 1854)		+	
	9. Ընտանիք Մանրաբզեղներ - Melyridae			
36.	Malachius sp.		+	
	10. Ընտանիք Dasytidae			
37.	Enicopus pilosus (Scopoli, 1763)	+		
	11. Ընտանիք Սևամարմիններ - Tenebrionidae			
38.	Tentyria tessulata Tauscher, 1812			
39.	Blaps lethifera Marsham, 1802	+		
40.	Gonocephalum granulatum pusillum (Fabricius, 1791)		+	
41.	Crypticus quisquillius (Linnaeus, 1761)			
42.	Lagria hirta (Linnaeus, 1758)		+	
	12. Ընտանիք Mordellidae			
43.	Mordellidae sp.		+	
	13. Ընտանիք Փայլաբեղներ - Nitidulidae			
44.	Meligethes sp.		+	
	14. Ընտանիք Զատիկներ - Coccinellidae			

45.	Hippodamia variegata (Goeze, 1777)	+		
46.	Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758)	+	+	
47.	Coccinella septempunctata (Linnaeus, 1758)	+	+	
	15. Ընտանիք Երկարաբեղիկներ - Cerambycidae			
48.	Pseudovadonia livida bicarinata (Arnold, 1869)		+	
	16. Ընտանիք Տերևակերներ - Chrysomelidae			
49.	Cryptocephalus concolor Suffrian, 1847		+	
50.	Chrysolina herbacea (Duftschmid, 1825)		+	
51.	Altica sp. 1	+		
52.	Phyllotreta cf. nigripes (Fabricius, 1775)	+		
53.	Psylliodes sp.	+		
54.	Spermophagus sp.		+	
	17. Ընտանիք Brenidae			
55.	Apion s.l. sp.		+	
	18. Ընտանիք Փղիկներ - Curculionidae			
56.	Polydrusus inustus Germar, 1823		+	
57.	Sitona sp.		+	
58.	Psallidium maxillosum (Fabricius, 1792)	+		
59.	Cleonis pigra (Scopoli, 1763)		+	
60.	Cyphocleonus dealbatus (Gmelin, 1790)		+	
61.	Larinus sturnus (Schaller, 1783)	+		
	Ընդամենը բզեզներ	26	39	

Հավելված

Ուսումնասիրված տարածքի բզեզների որոշ տեսակներ



<i>Carabus cribratus</i> ցայտագնայուկ բզեզի վերնաթևերը	Գնայուկ բզեզ <i>Cymindis scapularis</i>
	
Սրամարմին բզեզ <i>Ocypus picipennis</i>	Հիստերիդ բզեզ <i>Hister quadrimaculatus</i>
	
Կոյաբզեզ <i>Chilo thorax distinctus</i>	Սևամարմին բզեզ <i>Gonocephalum granulatum pusillum</i>

ՈՐՆԱՇԱՐԱՎՈՐՆԵՐ

Ձկներ

Հետազոտության տարածքը

Սյունիքի մարզի Դաստակերտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի ազդեցության գոտում գտնվող Աղջկաձոր (Կըշտկոշկտի) գետում և Այրիգետում ձկների հայտնաբերման նպատակով 27-28.10.2025թ. իրականացվել են ձկնաբանական դիտարկումներ և նմուշառումներ հետևյալ աշխարհագրական 30 կետում (տե՛ս Աղյուսակ 1 և ուսումնասիրման մեթոդները):

Աղյուսակ 1.

Ձկնաբանական հետազոտությունների վայրերը

Նմուշա ռման վայրը	Կոորդինատները	Ուսումնասիրման գործիքը և մեթոդը	Վայրի անվանումը և ուսումնասիրության արդյունքը
1	39.363, 46.024	Ձեռքի ձկնորսական ցանց, ակնադիտարկում:	Աղջկաձոր (Կըշտկոշկտի) գետ: Ձկներ չեն հայտնաբերվել
2	39.362, 46.023	Ձեռքի ձկնորսական ցանց, ակնադիտարկում:	Աղջկաձոր (Կըշտկոշկտի) գետ: Ձկներ չեն հայտնաբերվել
3	39.361, 46.023	Ձեռքի ձկնորսական ցանց, ակնադիտարկում:	Աղջկաձոր (Կըշտկոշկտի) գետ: Ձկներ չեն հայտնաբերվել
4	39.360, 46.023	Ձեռքի ձկնորսական ցանց, ակնադիտարկում:	Աղջկաձոր (Կըշտկոշկտի) գետ: Ձկներ չեն հայտնաբերվել
5	39.364, 46.024	Ձեռքի ձկնորսական ցանց, ակնադիտարկում:	Աղջկաձոր (Կըշտկոշկտի) գետ: Ձկներ չեն հայտնաբերվել
6	39.365, 46.023	Ձեռքի ձկնորսական ցանց, ակնադիտարկում:	Աղջկաձոր (Կըշտկոշկտի) գետ: Ձկներ չեն հայտնաբերվել
7	39.366, 46.023	Ձեռքի ձկնորսական ցանց, ակնադիտարկում:	Աղջկաձոր (Կըշտկոշկտի) գետ: Ձկներ չեն հայտնաբերվել
8	39.367, 46.023	Ձեռքի ձկնորսական ցանց, ակնադիտարկում:	Աղջկաձոր (Կըշտկոշկտի) գետ: Ձկներ չեն հայտնաբերվել
9	39.368, 46.023	Ձեռքի ձկնորսական ցանց, ակնադիտարկում:	Աղջկաձոր (Կըշտկոշկտի) գետ: Ձկներ չեն հայտնաբերվել

10	39.369, 46.023	Ձեռքի ձկնորսական ցանց, ակնադիտարկում:	Աղջկաձոր (Կըշտկոշկտի) գետ: Ձկներ չեն հայտնաբերվել
11	39.370, 46.023	Ձեռքի ձկնորսական ցանց, ակնադիտարկում:	Աղջկաձոր (Կըշտկոշկտի) գետ: Ձկներ չեն հայտնաբերվել
12	39.370, 46.024	Ձեռքի ձկնորսական ցանց, ակնադիտարկում:	Աղջկաձոր (Կըշտկոշկտի) գետ: Ձկներ չեն հայտնաբերվել
13	39.372, 46.025	Ձեռքի ձկնորսական ցանց, ակնադիտարկում:	Աղջկաձոր (Կըշտկոշկտի) գետ: Ձկներ չեն հայտնաբերվել
14	39.374, 46.025	Ձեռքի ձկնորսական ցանց, ակնադիտարկում:	Աղջկաձոր (Կըշտկոշկտի) գետ: Ձկներ չեն հայտնաբերվել
15	39.376, 46.026	Ձեռքի ձկնորսական ցանց, ակնադիտարկում:	Աղջկաձոր (Կըշտկոշկտի) գետ: Ձկներ չեն հայտնաբերվել
16	39.378, 46.026	Ձեռքի ձկնորսական ցանց, ակնադիտարկում:	Աղջկաձոր (Կըշտկոշկտի) գետ: Ձկներ չեն հայտնաբերվել
17	39.379, 46.027	Ձեռքի ձկնորսական ցանց, ակնադիտարկում:	Աղջկաձոր (Կըշտկոշկտի) գետ: Ձկներ չեն հայտնաբերվել
18	39.379, 46.026	Ձեռքի ձկնորսական ցանց, ակնադիտարկում:	Աղջկաձոր (Կըշտկոշկտի) գետ: Ձկներ չեն հայտնաբերվել
19	39.380, 46.027	Ձեռքի ձկնորսական ցանց, ակնադիտարկում:	Աղջկաձոր (Կըշտկոշկտի) գետ: Ձկներ չեն հայտնաբերվել

20	39.387, 46.020	Ձեռքի ձկնորսական ցանց, ակնադիտարկում:	Աղջկաձոր (Կըշտկոշկտի) գետ: Ձկներ չեն հայտնաբերվել
21	39.388, 46.019	Ձեռքի ձկնորսական ցանց, ակնադիտարկում:	Աղջկաձոր (Կըշտկոշկտի) գետ: Ձկներ չեն հայտնաբերվել
22	39.389, 46.019	Ձեռքի ձկնորսական ցանց, ակնադիտարկում:	Աղջկաձոր (Կըշտկոշկտի) գետ: Ձկներ չեն հայտնաբերվել
23	39.390, 46.019	Ձեռքի ձկնորսական ցանց, ակնադիտարկում:	Աղջկաձոր (Կըշտկոշկտի) գետ: Ձկներ չեն հայտնաբերվել
24	39.391, 46.018	Ձեռքի ձկնորսական ցանց, ակնադիտարկում:	Աղջկաձոր (Կըշտկոշկտի) գետ: Ձկներ չեն հայտնաբերվել
25	39.391, 46.018	Ձեռքի ձկնորսական ցանց, խեցգետնորսիչներ, վերհան ցանց, ակնադիտարկում:	Այրիգետ: Ձկներ չեն հայտնաբերվել
26	39.393, 46.017	Ձեռքի ձկնորսական ցանց, խեցգետնորսիչներ, վերհան ցանց, ակնադիտարկում:	Այրիգետ: Ձկներ չեն հայտնաբերվել
27	39.394, 46.017	Ձեռքի ձկնորսական ցանց, խեցգետնորսիչներ, վերհան ցանց, ակնադիտարկում:	Այրիգետ: Հայտնաբերվել է 3 ձկնատեսակ՝ կողակ, արևելյան տառեխիկ, Կուրի բեղաձուկ
28	39.393, 46.016	Ձեռքի ձկնորսական ցանց,	Այրիգետ: Ձկներ չեն հայտնաբերվել

		խեցգետնորսիչներ, վերհան ցանց, ակնադիտարկում:	
29	39.394, 46.015	Ձեռքի ձկնորսական ցանց, խեցգետնորսիչներ, վերհան ցանց, ակնադիտարկում:	Այրիզետ: Ձկներ չեն հայտնաբերվել
30	39.394, 46.014	Ձեռքի ձկնորսական ցանց, խեցգետնորսիչներ, վերհան ցանց, ակնադիտարկում:	Այրիզետ: Հայտնաբերվել է 2 ձկնատեսակ՝ արևելյան տառեխիկ, Կուրի բեղաձուկ:

Ուսումնասիրման մեթոդները

Ձկների որսը կատարվել է 70 սմ տրամագիծ ունեցող վերհան ձկնորսական ցանցով (ցանցի ճեղքերի մեծությունը 0.5 սմ), ձեռքի ձկնորսական ցանցով (ցանցի ճեղքերի մեծությունը 1.0 սմ), 90 սմ տրամագիծ ունեցող դնովի խեցգետնորսիչներով, (ցանցի ճեղքերի մեծությունը 0.5 սմ):

Խեցգետնորսիչները տեղադրվել են գետի առանձին հատվածներում, ափերին հարակից տարածքներում 0,5-1,5 մ խորության վրա: Խեցգետնորսիչները ջրում մնացել են 2-3 ժամ: Աղջկաձոր գետու ուսումնասիրման համար օգտագործվել է ձեռքի ձկնորսական ցանցը՝ այն պարբերաբար սուզելով ջրի մեջ և որս կատարելով սկսած ակունքից (թունելի միջից) մինչև Այրիզետի հետ միախառնվելու վայրը (մինչ այդ Աղջկաձոր գետը մոտ 400 մ հոսում է ստորգետնյա թունելով/խողովակով և այստեղ որևէ ձկնաբանական դիտարկում հնարավոր չէր իրականացնել):

Ուսումնասիրությունների արդյունքները

1. Ներկայում Աղջկաձոր (Կըշտկոշտի) գետում բացակայում է որևէ ձկնատեսակ: Նման իրավիճակը պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով՝

հանքային նյութերով ջրի աղտոտվածությամբ, ձկների համար կերային բազայի (բենթոս, պլանկտոն) խիստ սակավությամբ, ձկների տեսակների մեծ մասի համար անանցանելի արգելքների (ստորգետնյա խողովակներ, հիդրոտեխնիկական կառույցներ) առկայությամբ:

2. Այրի գետի ուսումնասիրված հատվածներում հանդիպում է երեք ձկնատեսակ՝

- Արևելյան տառեխիկ *Alburnoides eichwaldii*
- Կուրի բեղաձուկ *Barbus cyri*
- Կողակ *Capoeta capoeta*

Քանակապես գերակշռում են արևելյան տառեխիկը և Կուրի բեղաձուկը, որոնք կազմում են որսված ձկների 98,2 %:



Կուրի բեղաձուկ



Արևելյան տառեխիկ

ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՈՂՆԱՇԱՐԱՎՈՐՆԵՐ

Սույն հաշվետվության համար նյութ են ծառայել գրականության տվյալները, ինչպես նաև դաշտային հետազոտությունների արդյունքում ստացված տվյալները, որոնք հավաքվել են Դաստակերտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի համար նախատեսված տարածքում:

Հետազոտական աշխատանքները սկսելուց առաջ մեր կողմից կատարվել է տարածքին վերաբերվող հասանելի գիտական գրականության մշակում (հողվածներ, գրքեր, հաշվետվություններ, Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի հավաքածու): Մեր ենթակայության տակ գտնվող գրականության տվյալների մշակման ընթացքում (Даль С.К. 1954, Гептнер В.Г. и др.

1967., Мартиросян Б.А., Папанян С.Б. 1983., Бибииков Д.И. 1985, Агаджанян Ф.С. 1986, Касабян М.Г. 1986, 2001, Попов Г.Ю. 2003, Авагян А.В. 2010, Агасян А. Л., 1985, 1986, 1996, Aram Aghasyan and all, 2013, Даревский И. С., 1957, 1975, Петросян Р 2018, Туниев Б. С. и др. 2009, Arakelyan M. and all 2011, Adamian, M.S. and Klem, D. Jr. 1999. А. Ф. Ляйстер, Г. В. Соснин, 1942, Դանիելյան Ֆ. 2016, ՀՀ Կենդանիների Կարմիր Գիրք 1987, 2010., Ecoregional Conservation Plan for the Caucasus 2010, 2012., հաշվետվություններ WWF և ASPB՝ Կարևորագույն թռչնաբանական և կենսաբազմազանության (IBA, KBA) տարածքների մասին (Դրանց հիման վրա հայտնաբերվել են բազմաթիվ տեսակներ, որոնք նկատվել են այս տարածքում վերջին տասնամյակների ընթացքում: Բացի այս տվյալներից, մենք օգտագործել ենք նաև նախնական տվյալներ «The “EMERALD” network in the republic of Armenia» 2016», առցանց հարթակներից տվյալներ (<https://observation.org>) և (<https://www.ibat-alliance.org/>):

Ելնելով վերոգրյալից՝ մենք կազմել ենք ողնաշարավորների տեսակների նախնական ցուցակները, որոնք ակնկալվում է, որ կհայտնաբերվեն այս տարածքում, ինչպես նաև այն տեսակները, որոնք նշվել են մեր հետազոտության ընթացքում (**Աղյուսակ 1,2,3**): Բոլոր աղյուսակներում նշված են ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում և Հայաստանի Կարմիր գրքում գրանցված տեսակները: Թռչունների հետ կապված աղյուսակում նշվում են նաև տեսակների առկայության կարգավիճակը Հայաստանում և ակնկալվող կարգավիճակը ուսումնասիրվող տարածքում:

Բացի այդ, մենք առանձնացրել ենք ստացիոնար դիտակետեր ամբողջ նախագծված տարածքում որտեղ կարճաժամկետ կանգառներ են արվել՝ դիտարկելու թռչունների և սողունների ակտիվությունը:

Տարածքի հերպետոֆաունան որոշվել է հիմնականում տեսողական հանդիպումների և մոդեսների և օձերի (քարերի, թփերի տակ և այլն) ապրելավայրերի զննությամբ:

Հետազոտվող տարածքում գրանցված թռչունների և տեսակների դիտարկման համար օգտագործվել են “Kite 10x40” հեռադիտակ և “Kowa” մոնոդիտակ՝ 20x40x60 խոշորացումով: Ուսումնասիրվող տարածքում թռչունների տեսակների կազմը որոշելու համար օգտագործվել են դաշտային որոշիչներ՝ Collins Bird Guide 2009, Dick Forsman 2016:

Սողունների և երկկենցաղների նույնականացման համար օգտագործվել է Դանիելյան Ֆ., Առաքելյան Մ որոշիչը 2016թ.: Փոքր և միջին կաթնասունների որոշման համար օգտագործվել է «Кузнецова Б. “Определитель позвоночных животных фауны СССР” 1975.» որոշիչը:

Սողուններ և երկկենցաղներ

Սողունների և երկկենցաղների դիտարկումներ են իրականացվել նախագծված տարածքում և անմիջական շրջակայքում: Հարկ է ի սկզբանե նշել, որ սողունների թիվը շատ քիչ է, չնայած նրանցից շատերի համար հարմար միջավայրերի առկայությանը: **Աղյուսակ 3**-ում ներկայացված են այն տեսակները, որոնք նշված են գրականության մեջ և այլ աղբյուրներում, ինչպես նաև փաստացի գրանցված են ծրագրի տարածքում:

Աղյուսակ. 3 Ուսումնասիրվող տարածքի սողունների և երկկենցաղների ցանկ

Family	No	Scientific names	Armenian name	1	2	3
Reptilia						
Agamidae	1	Laudakia caucasia	Կովկասյան ագամա	+	+	
Lacertidae	2	Darevskia raddei	Ռադդեյի ժայռային մողես	+	+	
	3	Lacerta media	Միջին մողես	+	+	
Colubridae	4	Eirenis punctatolineatus	Հայկական Էյրենիս	+	-	
	5	<i>Zamenis hohenackeri</i>	Անդրկովկասյն սահնօձ	+	+	LC vu
	6	<i>Telescopus fallax</i>	Կովկասյան կատվօձ	-	+	LC vu
Viperidae	7	Macrovipera lebetinus	Գյուրգա	+	-	
	8	<i>Vipera raddei</i>	Հայկական իծ	+	-	NT vu
Amphibia						
Bufonidae	1	Bufo viridis	Կանաչ դոդոշ	+	+	
Ranidae	2	Pelophylax ridibundus	Լճագորտ	+	+	

1. - առկայությունը մասին տեղեկատվություն տարբեր աղբյուրներից
2. - առկայության տվյալներ՝ ըստ մեր հետազոտության
3. - կարմիր գույնով նշված են Միջազգային և ՀՀ կարմիր գրքում գրանցված տեսակները

Աղյուսակ 3-ում ներկայացված գրական աղբյուրների հիման վրա ընդգրկված 8 տեսակ սողուններից և 2 տեսակ երկկենցաղներից դաշտային ուսումնասիրությունների ընթացքում արձանագրվել են 5 տեսակ սողուններ և 2 տեսակ ջրիմուռներ: Կովկասյան կատվօձը մինչև այժմ այս տարածքում չէր նշվել և դաշտային աշխատանքների ընթացքում արձանագրվել է առաջին անգամ: Շատ հազվագյուտ Անդրկովկասյն սահնօձը նկատվել է միայն մեկ անգամ՝ Դաստակերտ գետի և անտառային թփերի բուսականությամբ ծածկված փոքր տարածքի միջև:

ընկած հարթ բացատում: Պետք է նշել, որ այս առանձնյակի հայտնաբերման վայրը բնորոշ չէ այս տեսակի բնակավայրի համար, քանի որ այս տեսակը սովորաբար ապրում է ավելի անտառապատ տարածքներում և ցածր բարձրություններում:

Կովկասյան ագաման, Ռադդեյի ժայռային մողեսը և Միջին մողեսը նկատվել են տարածքի ամենացածր հատվածում՝ մինչև 2000 մ բարձրության վրա փոքրիկ քարաժայռային ելուստներում, որտեղ աճում էր պետրոֆիլ բուսականություն: Հատկանշյալ թունավոր օձերից՝ գյուրզան և հայկական իժը, դաշտային այցելությունների ընթացքում չեն նկատվել, չնայած գրականության մեջ նշված են եղել տվյալ տարածքի համար: Կանաչ դոդոշը նկատվել է լքված այգիներում և հին կառույցների մոտ գտնվող խոնավ տեղերում, իսկ լճագորտը՝ Այրիգետ գետի վտակների Կոշկշտի և Դաստակերտ ջրերում:

Թռչուններ

Ելնելով նախատեսված տարածքով գիտարշավների ընթացքում ձեռք բերված նյութերից և գրականությունից՝ կազմվել է **Աղյուսակ 1**-ը, որը ներառում է տարածքում և նրա անմիջական հարևանությամբ որոշ թռչունների ակնկալվող ներկայությունը: Տվյալ տարածքում հնարավոր բնակվող տեսակներն ընտրելիս հաշվի ենք առել դրանցից յուրաքանչյուրին բնորոշ կենսամիջավայրերի համապատասխանությունը (լեռնատափաստան, թփուտներ, քարակույտեր, ոչ մեծ ժայռեր, ջուր, խոնավ տարածքներ, մշակովի գյուղատնտեսական նշանակության հողեր և այլն): Թռչունների տեսակները, որոնք և՛ ենթադրաբար, և՛ փաստացի նշվել են դաշտային հետազոտության ընթացքում, ստորև աղյուսակում նշված են ըստ բնակության կարգավիճակի, թե՛ Հայաստանում, թե՛ հետազոտվող տարածքում:

Աղյուսակ 1. Ենթադրվող և իրականում գրանցված թռչնատեսակների ցանկը

No	Armenian names	Scientific names	1	2	3	IUCN	ՀՀ Կ.Գ
	Accipitridae						
1	Կրետակեր	<i>Pernis apivorus</i>	Bbr	Nbr	v		
2	Սպիտակագլուխ անգղ	<i>Gyps fulvus</i>	YrBr	Nbr		LC	VU D1
3	Քարաթիվ	<i>Aquila chrysaetos</i>	Bbr	Nbr	v	LC	VU D1
4	Դաշտային մկնաճուռակ	<i>Circus cyaneus</i>	W	W			
5	Լորաճուռակ	<i>Accipiter nisus</i>	YrBr	Nbr	v		
6	Տափաստանային ճուռակ	<i>Buteo rufinus</i>	YrBr	Nbr	v		
	Falconidae						

7	Սովորական հողմավար բազե	Falco tinnunculus	YrBr	Br	v		
	Phasianidae						
8	Քարակաքավ	Alectoris chukar	YrBr	Br?			
9	Մոխրագույն կաքավ	Perdix perdix	YrBr	Br	v		
10	Լոր	Coturnix coturnix	Bbr	Bbr	v		
	Columbidae						
11	Թխակապույտ աղավնի	Columba livia	YrBr	Nbr	v		
12	Հոբալ	Columba oenas	YrBr	Nbr	v		
13	Անտառային աղավնի	Columba palumbus	YrBr	Br	v		
	Cuculidae						
14	Սովորական կկու	Cuculus canorus	Bbr	Nbr	v		
	Strigidae						
15	Տնային բվիկ	Athene noctua	YrBr	Bbr	v		
	Apodidae						
16	Սև մանգաղաթև	Apus apus	Bbr	Nbr	v		
	Caprimulgidae						
17	Այծկիթ	Caprimulgus europaeus	Bbr	Bbr	v		
	Meropidae						
18	Ոսկեգույն մեղվակեր	Merops apiaster	Bbr	Bbr	v		
	Upupidae						
19	Հոպոպ	Upupa epops	Bbr	Bbr	v		
	Alaudidae						
20	Տափաստանային արտույտ	Melanocorypha calandra	Bbr	Nbr			
21	Երկբծավոր արտույտ	Melanocorypha bimaculata	Bbr	Nbr	v		
	Hirundinidae						
22	Ժայռային ծիծեռնակ	Hirundo rupestris	Bbr	Nbr			
23	Գյուղական ծիծեռնակ	Hirundo rustica	Bbr	Bbr	v		
24	Քաղաքային ծիծեռնակ	Delichon urbicum	Bbr	Nbr			
	Motacillidae						
25	Դաշտային ձիուկ	Anthus campestris	Bbr	Bbr			
26	Դեղին խաղտունիկ	Motacilla flava	Bbr	Nbr	v		
27	Սպիտակ խաղտունիկ	Motacilla alba	YrBr	Br	v		

28	Լեռնային խաղտունիկ	Motacilla cinerea	YrBr	Br	v		
	Muscicapidae						
29	Արշալուսիկ	Erithacus rubecula	YrBr	Nbr	v		
30	Կապտափող սոխակ	Luscinia svecica	Bbr	Nbr			
31	Սևուկ կարմրատուտ	Phoenicurus ochruros	YrBr	Br	v		
32	Մարգագետնային չքչքան	Saxicola rubetra	Bbr	Bbr	v		
33	Սևագլուխ չքչքան	Saxicola torquatus	Bbr	Nbr			
34	Սովորական քարաթռչնակ	Oenanthe oenanthe	Bbr	Bbr	v		
	Turdidae						
35	Սև կեռնեխ	Turdus merula	YrBr	Br	v		
	Sylviidae						
36	Մոխրագույն շահրիկ	Sylvia communis	Bbr	Bbr	v		
	Muscicapidae						
37	Մոխրագույն ճանճորս	Muscicapa striata	Bbr	Nbr	v		
	Paridae						
38	Մեծ երաշտահավ	Parus major	YrBr	Br			
	Sittidae						
39	Ժայռային փոքր սիտեղ	Sitta neumayer	YrBr	Br	v		
	Laniidae						
40	Ժուլան	Lanius collurio	Bbr	Bbr	v		
41	Սևաձկատ շամփրուկ	Lanius minor	Bbr	Bbr			
	Corvidae						
42	Սովորական կաչաղակ	Pica pica	YrBr	Br	v		
43	Անտառային կաչաղակ	Garrulus glandarius	YrBr	Br	v		
44	Մոխրագույն ագռավ	Corvus corone	YrBr	Br?	v		
45	Սև ագռավ	Corvus corax	YrBr	Nbr	v		
	Sturnidae						
46	Սովորական սարյակ	Sturnus vulgaris	YrBr	Nbr	v		
	Passeridae						
47	Տնային ճնճղուկ	Passer domesticus	YrBr	Br			
48	Դաշտային ճնճղուկ	Passer montanus	YrBr	Br	v		

	Fringillidae						
49	Ամուրիկ	Fringilla coelebs	YrBr	Br			
50	Կարմրակատար	Carduelis carduelis	YrBr	Br			
51	Կանեփնուկ	Carduelis cannabina	YrBr	Br	v		
	Emberizidae						
52	Սովորական դրախտապան	Emberiza citrinella	W	W			
53	Լեռնային դրախտապան	Emberiza cia	YrBr	Br	v		
54	Կորեկնուկ	Miliaria calandra	YrBr	Br	v		

1.-Հայաստանում կարգավիճակը

2.- Ծրագրային տարածքում կարգավիճակը

V - առկայության տվյալներ՝ ըստ մեր հետազոտության

IUCN – ԲՊՄՄ կարգավիճակ

ՀՀ ԿԳ - Կարգավիճակը ըստ ՀՀ կենդանիների կարմիր գրքի

YrBr -առկա կլոր տարի, բնադրող

YrNbr - առկա կլոր տարի, չբնադրող

Nbr - չբնադրող

Bbr -բնադրող չվող

Br -բնադրող

W - ձմեռող

Վերլուծելով **աղյուսակ 1**-ը կարող ենք տեսնել, որ ուսումնասիրող տարածքում ըստ գրական տվյալների և դաշտային ուսումնասիրությունների ընթացքում ստացված արդյունքների, կարող են հանդիպել 54 տեսակի թռչուններ, որոնք պատկանում են 25 ընտանիքների: Պետք է նշել, որ աղյուսակում ներկայացված 54 տեսակներից դաշտային աշխատանքների ընթացքում փաստացիորեն արձանագրվել է 39 տեսակ: Աղյուսակից պարզ է դառնում, որ ամենամեծ թվով ներկայացված խումբը ճնճղուկազգիներն են: Հաջորդ առավել տարածված խումբը գիշատիչ թռչուններն են, որոնք հիմնականում ներկայացված են ճուռականմաններով և մեկ տեսակի բազեանմանով: Բացի բազմաքանակ լինելուց, ճնճղուկազգիները ըստ նախնական տվյալների նաև տարածքի ամենատարածված բնադրող տեսակներն են: Նրանց բնադրությունը պայմանավորված է տարածքի գրեթե բոլոր կենսաբանակ հաբիթատներով, ինչպիսիք են բաց լեռնատափաստանային լանջերը, հազվադեպ ծառափայլին բուսականությամբ ծածկված լանջերը, փոքր քարաժայռային ելուստները և քարաբեկորների կուտակումները: Ամենայն հավանականությամբ բնադրության համար կարող են ծառայել նաև փոքրիկ ձորակները, որոնք ծածկված են խիտ թփուտներով: Տարածքի փոքրագույն վտակային անտառը նույնպես կարող է ներգրավել որոշ ճնճղուկազգիների, օրինակ՝ Ճանճորսների (muscapidae) ընտանիքի ներկայացուցիչներին: Որոշ տեսակների համար բնադրական տեղամասեր կարող են հանդիսանալ նաև այն լանջերը, որտեղ առկա են ծառեր, ինչպես նաև հին, լքված պտղատու այգիները: Այնուամենայնիվ պետք է հաշվի առնել, որ դաշտային ուսումնասիրությունները իրականացվել են ուշ ամռանը և աշնանը, երբ

տարածքում թռչունների գտնվելու կարգավիճակի ճշգրտումը բավական բարդ է: Այդ պատճառով տեսակների տարածվածության և տարածքի յուրացման առավել իրական պատկեր ստանալու համար անհրաժեշտ է իրականացնել լրացուցիչ գարնանային դաշտային հետազոտություններ: Ըստ ներկայումս արձանագրված տվյալների՝ տարածքում ենթադրվող բազմաթիվ տեսակներից միայն երկու տեսակ են ընդգրկվում IUCN-ի ցանկում որպես LC և միաժամանակ Հայաստանի Կարմիր Գրքում՝ որպես խոցելի՝ VU կարգավիճակ ունեցող տեսակներ: Ստորև ներկայացվում է կարմիրգոյքային տեսակների կարճ բնութագիրը:

Սպիտակագլուխ անգղ (Gyps fulvus) - Կարգավիճակ՝ Least Concern (ver. 3.1)
Տեսակը համարվում է «Փոքր մտահոգություն» (ոչ վտանգված): Ըստ միջազգային գնահատման՝ սպիտակագլուխ անգղի ընդհանուր տարածվածությունն ու թվաքանակը համարվում են կայուն, թեև որոշ շրջաններում նկատվում է նվազում: Հայաստանում վիճակը՝ VU (Vulnerable / խոցելի)
Համարվում է խոցելի տեսակ: Տարածվածությունը սահմանափակ է, և բնական պոպուլյացիան զգալուն է սննդային բազայի նվազման ու այլ գործոնների նկատմամբ: Տարածումն ուսումնասիրող տարածքում.
Ուսումնասիրվող տարածքի վերևում երբեմն երևում է սննդի որոնման ժամանակ՝ լեշ փնտրելիս:
Բնադրության վայրերը գտնվում են հետազոտվող տարածքի սահմաններից դուրս:

Քարարծիվ (Aquila chrysaetos) - Կարգավիճակ՝ Least Concern (ver. 3.1)
Տեսակը համարվում է «Փոքր մտահոգություն»՝ գլոբալ մակարդակում վտանգված չէ: Թվում է կայուն, և լայն տարածում ունի: Հայաստանում՝ VU (Vulnerable / խոցելի)
Հայաստանում համարվում է խոցելի տեսակ: Թվաքանակը մեծ չէ, և որոշ շրջաններում նվազման միտումներ կան՝ հիմնականում մարդու գործունեության ու սննդային բազայի փոփոխության պատճառով:
Տարածումն ուսումնասիրող տարածքում.
Ինչպես նախորդ տեսակը (սպիտակագլուխ անգղը), քարարծիվը նույնպես հայտնվում է ուսումնասիրող տարածքի վերևում՝ սննդի որոնման ժամանակ: Մնվում է հիմնականում մոխրագույն կաքավով, փոքր կրծողներով ու նապաստակներով: Ինչպես և նախորդ տեսակի այնպես էլ այս տեսակի բնադրման վայրերը գտնվում են նախագծային տարածքից դուրս:

Կաթնասուններ

Հիմնվելով առկա գրական տվյալների և էքսպեդիցիոն ելքերի ընթացքում ձեռք բերված տվյալների վրա՝ կազմվել է **Աղյուսակ 2**-ը, որտեղ ներառվել են կենդանիների ենթադրյալ ներկայությունը, տեսողականորեն նշված և փաստացի հայտնաբերված կենդանիների առկայության նշանները: ԲՊՄՄ ցուցակում և Հայաստանի Կարմիր գրքում ընդգրկված տեսակները նշված են կարմիրով, տրված է համառոտ տեղեկատվություն:

Աղյուսակ 2. Ուսումնասիրվող տարածքի կաթնասունների ցանկը

NO/ Fam	Scientific names	Armenian Name	English name			
				1	2	3
Erinacedae						
1.	Erinaceus concolor	Սպիտակափորն ողնի	Southern white-breasted hedgehog	+	+	
Bovidae						
2.	Capra aegagrus	Բեզուարյան այծ	Wild goat	+	-?	NT vu
3.	Ovis orientalis gmelinii	Հայկական մուֆլոն	Armenian mouflon	+	-?	VU en
Soricidae						
4.	Sorex araneus	Սովորական գորշատամ	Common shrew	+	-	
Gliridae						
5.	Dryomys nitedula	Անտառային քնամոլ	Forest dormouse	+	-	
Leporidae						
6.	Lepus europaeus	Նապաստակ	European hare	+	+	
Suidae						
7.	Sus scrofa	Վայրի խոզ	Wild boar	+	-	
Mustelidae						
8.	Martes foina	Քարակզաքիս	Beech marten	+	+	
9.	Mustela nivalis	Աքիս	Least weasel	+	+	
10.	Meles meles	Գորշուկ	Badger	+	++	
Ursidae						
11.	Ursus arctos	Գորշ արջ	Brown bear	+	-?	LC vu
Canidae						
12.	Canis lupus	Գայլ	Gray wolf	+	+	

13.	Canis aureus	Զախկալ	Jackal	-	+	
14.	Vulpes vulpes	Սովորական աղվես	Red fox	+	+	
Felidae						
15.	<i>Felis silvestris</i>	Անտառային կատու	Wild cat	+	-	LC vu
16.	Lynx lynx	Լուսան	Lynx	+	-	
Cricetidae						
17.	Cricetulus migratorius	Մոխրագույն համստերիկ	Gray dwarf hamster	+	-	
18.	Microtus arvalis	Սովորական դաշտամուկ	Common vole	+	+	
Gerbillidae						
19.	Meriones persicus	Պարսկական ավազամուկ	Persian jird	+	-	
Muridae						
20.	Sylvaemus uralensis	Փոքր անտառային մուկ	Ural field mouse	+	+	

1. – առկայությունը մասին տեղեկատվություն տարբեր աղբյուրներից
2. – առկայության տվյալներ՝ ըստ մեր հետազոտության
3. – կարմիր գույնով նշված են Միջազգային և ՀՀ կարմիր գրքում գրանցված տեսակները

Դաստակերտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի համար նախատեսված տարածքում հնարավոր բնակվող կաթնասունների նախնական ցանկը ներկայացված է 20 տեսակով (**Աղյուսակ 2**): Ամենամեծ թվով խումբը գիշատիչ կաթնասուններն են, որոնք հիմնականում կազմված են շնանմանների և կզաքիսազգիների ներկայացուցիչներից: Երկրորդ ամենամեծ թվով խմբին պատկանում են փոքր կաթնասունները, հիմնականում կրծողներ և միջատակերներ: Դաշտային աշխատանքների ընթացքում աղյուսակում ներկայացված 20 տեսակից տեսողականորեն կամ կենսագործունեության հետքերով արձանագրվել են ընդամենը 10 տեսակ: Բաց լեռնատափաստանային բուսածածկ լանջերում գտնվել են փորսուղի փորած փոսեր և զուգարաններ: Այդտեղ էլ քարակույտերի և ժայռերի վրա որոնք ծածկված էին փոքր թփերով հանդիպել են կզաքիսն ու աքիսը:

Քարաքեկորների կուտակումներում հանդիպել է սովորական դաշտամուկը: Անտառային բուսածածկի փոքր հատվածներում արձանագրվել են սպիտակափոր ոզնին և փոքր անտառային մուկը: Աղվեսի հետքեր և արտաթորանքներ հանդիպել են գրեթե ամբողջ ուսումնասիրված տարածքում, իսկ գայլի հետքեր և արտաթորումներ երկու անգամ նշվել են անտառատափաստանոտ և ենթալպյան գոտիներում: Կենդանիներին ըստ տարածքի օգտագործման կարելի է բաժանել երկու խմբի՝ այն կենդանիները, որոնք օգտագործում են տարածքը որպես անցուղի, ինչպես գայլն ու աղվեսը, և այն կենդանիները, որոնց բնական բնակավայրը ամբողջությամբ ընդգրկվում է նախագծային տարածքի մեջ, օրինակ՝ ոզնին, կզաքիսը, աքիսը, նապաստակը, բոլոր փոքր միջատակերներն ու կրծողները: Աղյուսակում նշված բեզուարյան այծը և հայկական մուֆլոնը հիմնված են հին աղբյուրների տվյալների և որոշ տեղացի բնակիչների հաղորդումների վրա, սակայն ժամանակակից հետազոտական և բնապահպանական նախագծերի արդյունքում դրանց ներկայությունը տարածքում հաստատված չէ: Նմանապես, վայրի խոզը, գորշ արջը և անտառային կատուն ընդգրկված են աղյուսակում տեղացի բնակիչների հաղորդումների հիման վրա, որոնք նշել են դրանց հազվագյուտ հանդիպումները վերջին շրջանում, սակայն այս տեղեկատվությունը անորոշ է և պահանջում է հետևողական ստուգում հետագա դաշտային այցելությունների ընթացքում:

Լուսանկարներ



Սպիտակագլուխ անգղ




Տափաստանային ճուռակ



Լորաճուռակ



Սովորական հողմավար բազե



Մոխրագույն կաքավ



Ժուլան



Անտառային կաչաղակ



Լեռնային դրախտապան



Սևուկ կարմրատուտ



Սովորական քարաթռչնակ



Կարմրակատար



Կանեփնուկ



Սպիտակափորն ոգնի



Նապաստակ



Աքիս



Սովորական աղվես



Գորշուկի կղանք



Գայլի կղանք



Ռադդեյի ժայռային մողես



Կովկասյան ագամա



Անդրկովկասյն սահնօձ



Կովկասյան կատվաօձ



Կանաչ դդուշ



Լճագորտ